


INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA PELE

Nome _____

Idade _____ Serviço _____

Data da observação ____ / ____ / ____

| Local avaliado | Tamanho | Condição da pele Profundidade | Estadío |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 1. Face posterior da cabeça | _____ | _____ | _____ |
| 2. Orelha direita | _____ | _____ | _____ |
| 3. Orelha esquerda | _____ | _____ | _____ |
| 4. Ombro direito | _____ | _____ | _____ |
| 5. Ombro esquerdo | _____ | _____ | _____ |
| 6. Cotovelo direito | _____ | _____ | _____ |
| 7. Cotovelo esquerdo | _____ | _____ | _____ |
| 8. Vértebras (superior médio) | _____ | _____ | _____ |
| 9. Sacro | _____ | _____ | _____ |
| 10. Cóccis | _____ | _____ | _____ |
| 11. Crista ilíaca direita | _____ | _____ | _____ |
| 12. Crista ilíaca esquerda | _____ | _____ | _____ |
| 13. Trocanter direito (anca) | _____ | _____ | _____ |
| 14. Trocanter esquerdo (anca) | _____ | _____ | _____ |
| 15. Tuberosidade iaquiática direita | _____ | _____ | _____ |
| 16. Tuberosidade isquiática esquerda | _____ | _____ | _____ |
| 17. Coxa direita | _____ | _____ | _____ |
| 18. Coxa esquerda | _____ | _____ | _____ |
| 19. Joelho direito | _____ | _____ | _____ |
| 20. Joelho esquerdo | _____ | _____ | _____ |
| 21. Perna direita | _____ | _____ | _____ |
| 22. Perna esquerda | _____ | _____ | _____ |
| 23. Tornozelo direito | _____ | _____ | _____ |
| 24. Tornozelo esquerdo | _____ | _____ | _____ |
| 25. Calcanhar direito | _____ | _____ | _____ |
| 26. Calcanhar esquerdo | _____ | _____ | _____ |
| 27. Dedos do pé direito | _____ | _____ | _____ |
| 28. Dedos do pé esquerdo | _____ | _____ | _____ |
| 29. Outro (especificar) | _____ | _____ | _____ |



Grau I – Eritema cutâneo / hiperémia não reversível ao alívio da pressão; precursor da ulceração da pele.

Grau II – Perda parcial da espessura da pele que pode afectar a epiderme e/ou a derme. A úlcera é uma lesão superficial que pode ter aspecto de escoriação, flictena ou pequena cratera.

Grau III – Perda total da pele com lesão ou necrose do tecido subcutâneo, podendo estender-se mais e afectar a camada subjacente.

Grau IV – Lesão em toda a espessura da pele com destruição massiva, necrose tecidual ou danos musculares, ósseos ou de elementos de suporte (tendões, cápsula articular, etc.). Estas lesões podem apresentar trajectos sinuosos e socavados.